

どうすればいいの？ポリオワクチン

ポリオワクチンを

まだ1回も
受けていない

生ポリオワクチンを

すでに1回
受けている

不活化ポリオワクチンを

1～3回
受けている

生ポリオワクチンを

すでに2回
受けている

不活化ポリオワクチンを

合計4回

受けてください

不活化ポリオワクチンは、
初回接種3回+追加接種1回、
合計4回の接種が必要です。

不活化ポリオワクチンを

あと3回

受けてください

生ポリオワクチンを1回接種
されている方は、合計3回の
不活化ポリオワクチン接種が
さらに必要です。

不活化ポリオワクチンが

合計4回となるよう
残りの回数を

受けてください

国内未承認の不活化ポリオ
ワクチンの接種を開始されて
いる方も、不足分を定期接種で
受けることができます。


不活化ポリオワクチンは

**必要
ありません**

生ポリオワクチンをすでに2回
接種されている方は、さらに
不活化ポリオワクチンを接種
する必要はありません。

- ★使用する不活化ポリオワクチンは、単独の不活化ポリオワクチンまたは4種混合ワクチンです。
 - ☆ポリオワクチンまたは3種混合ワクチンの接種をすでに開始している方は、単独の不活化ポリオワクチンの接種を受けてください。
 - ☆ポリオワクチンと3種混合ワクチンが未接種の方は、4種混合ワクチンの接種を受けてください。
- ★不活化ポリオワクチンは、初回接種：20日から56日までの間隔をおいて3回、追加接種：初回接種終了後6か月以上の間隔をおいて1回、合計4回の接種が必要です。
 - ☆単独の不活化ポリオワクチンは、初回接種として20日以上の間隔をおけば接種可能であり、接種間隔の上限はありません。
 - ☆単独の不活化ポリオワクチンの追加接種は、10月23日より開始されました。

どうすればいいの？ポリオワクチン



初回接種として、生後3か月から生後12か月までに接種することが望ましいです。

追加接種として、生・不活化を問わず、全体を通して4回目となるポリオワクチンは、初回接種終了後6か月以上の間隔をおいてください。

※使用する不活化ポリオワクチンは、単独の不活化ポリオワクチンまたは4種混合ワクチンです。

- ・ポリオワクチンまたは3種混合ワクチンの接種をすでに開始している方は、単独の不活化ポリオワクチンの接種を受けてください。
- ・ポリオワクチンと3種混合ワクチンが未接種の方は、4種混合ワクチンの接種を受けてください。

★単独の不活化ポリオワクチンは、初回接種として20日以上の間隔をおけば接種可能であり、接種間隔の上限はありません。

☆追加接種は6か月以上おけば接種可能ですが、12か月から18か月の間隔をおくことが望ましいです。

単独の不活化ポリオワクチンの追加接種は、10月23日より開始されました。